



Аптека
садівника

Піклуємось з любов'ю!



Не для продажу

Визначник

шкідників, хвороб і бур'янів

+ Системи захисту культур

Зміст

Комплекси для захисту культурних рослин GreenBox	2	Піклуємось про моркву.....	32
Визначаєте препарат за кольором	8	Піклуємось про цибулю	34
Піклуємось про зерняткові (яблуна, груша, айва)	10	Піклуємось про газонні трави.....	36
Піклуємось про кісточкові (вишня, черешня, слива)	12	Піклуємось про троянди.....	38
Піклуємось про кісточкові (абрикос, персик, нектарин)	14	Піклуємось про декоративні (листяні і хвойні)	40
Піклуємось про ягідні (полуниця, малина, смородина та інші).....	16	Захист картоплі від бур'янів.....	42
Піклуємось про виноград	20	Захист томатів від бур'янів	43
Піклуємось про волоський горіх.....	22	Захист моркви від бур'янів	44
Піклуємось про пасльонові (картопля, томати, перець солодкий, баклажани).....	24	Захист полуниці та буряків від бур'янів.....	45
Піклуємось про капусту.....	28	Захист газонних трав від бур'янів.....	46
Піклуємось про гарбузові (огірок, кавун, диня, гарбуз).....	30	Захист плодкових культур і виноградників від бур'янів.....	47
		Ознаки дефіциту елементів живлення на культурах та підживлення культур.....	48



Обирайте GreenBox –
і ваші культури будуть
здоровими та захищеними

комплекс для

Захисту



GreenBox

GreenBox для кісточкових

Комплекс для захисту черешні, вишні, персика та інших культур від шкідників і хвороб



Культура. Черешня, вишня, слива, абрикос, персик, нектарин
Кількість дерев. 2-10
Об'єм робочого розчину на обробку. 10 л
Кількість обробок за сезон. 5



[Детальніше тут](#)

Вміст:

АЦ Люкс Ліквід, 10 мл – 2 шт., **Туріл**, 2 г – 1 шт.,
Гудвін, 5 мл + **Авангард Гроу Аміно**, 10 мл – 2 шт.,
Ескаліп, 7,5 мл – 1 шт., **Гарт**, 30 г – 2 шт., **Захисник**,
15 мл – 1 шт., **Страж**, 3 г – 2 шт., **Феномен Прайм**,
25 г – 1 шт., **Інгрес**, 4 мл – 3 шт., **інструкція** – 1 шт.,
рукавиці – 1 шт., **респіратор** – 1 шт.

GreenBox для зерняткових

Комплекс для захисту яблуні, груші та айви від шкідників і хвороб



Культура. Яблуна, груша, айва
Кількість дерев. 2-10
Об'єм робочого розчину на обробку. 10 л
Кількість обробок за сезон. 6



[Детальніше тут](#)

Вміст:

АЦ Люкс Ліквід, 10 мл – 1 шт., **Туріл**, 2 г – 1 шт.,
Гудвін, 5 мл + **Авангард Гроу Аміно**, 10 мл – 2 шт.,
Ескаліп, 7,5 мл – 1 шт., **Гарт**, 30 г – 2 шт., **Захисник**,
15 мл – 1 шт., **Страж**, 3 г – 2 шт., **Феномен Прайм**,
25 г – 2 шт., **Інгрес**, 4 мл – 4 шт., **інструкція** – 1 шт.,
рукавиці – 1 шт., **респіратор** – 1 шт.

GreenBox для ягідних

Комплекс для захисту малини, смородини, лохини та інших ягідних культур від шкідників і хвороб



Культура. Малина, смородина, порічки, агрус, лохина
Кількість кущів. 6-20
Об'єм робочого розчину на обробку. 10 л
Кількість обробок за сезон. 7



Детальніше тут

Вміст:

Антихруц, 10 мл – 2 шт., **Ато Жук**, 3 мл + **Авангард Стимул**, 10 мл – 1 шт., **Гудвін**, 5 мл + **Авангард Гроу Аміно**, 10 мл – 1 шт., **Ескаліп**, 7,5 мл – 1 шт., **Антигусінь**, 4 мл + **Самшит**, 3 мл – 4 шт., **Гарт**, 30 г – 2 шт., **Захисник**, 30 мл – 1 шт., **Страж**, 3 г – 3 шт., **Інгрес**, 4 мл – 4 шт., **інструкція** – 1 шт., **рукавиці** – 1 шт., **респіратор** – 1 шт.

GreenBox для полуниці

Комплекс для захисту полуниці від шкідників і хвороб



Культура. Полуниця
Площа. 2 сотки
Об'єм робочого розчину на обробку. 6-10 л
Кількість обробок за сезон. 5



Детальніше тут

Вміст:

Антихруц, 10 мл – 2 шт., **АЦ Люкс Ліквід**, 10 мл – 1 шт., **Ато Жук**, 3 мл + **Авангард Стимул**, 10 мл – 1 шт., **Ескаліп**, 7,5 мл – 1 шт., **Антигусінь**, 4 мл + **Самшит**, 3 мл – 2 шт., **Гарт**, 30 г – 1 шт., **Захисник**, 30 мл – 1 шт., **Страж**, 3 г – 6 шт., **Інгрес**, 4 мл – 3 шт., **інструкція** – 1 шт., **рукавиці** – 1 шт., **респіратор** – 1 шт.

GreenBox для газону і квітів

Комплекс для захисту газонних трав і квітів від шкідників, хвороб і бур'янів

M x 2
рази більше
препаратів



Культура. Газон, троянди чи інші квіти

Площа, кількість кущів.

2 сотки, 10 кущів троянд

Об'єм робочого розчину на обробку.

6-10 л – газон, 5-12 л – троянди чи інші квіти

Кількість обробок за сезон.

2-3 – газон, 2-3 – троянди чи інші квіти



Детальніше тут

Вміст:

Антихрущ, 10 мл – 3 шт., **Ато Жук**, 3 мл + **Авангард Стимул**, 10 мл – 2 шт., **Фундазим**, 10 г – 2 шт., **Страж**, 3 г – 3 шт., **Гольф**, 3 г – 2 шт., **Авангард Квіти, трави**, 30 мл – 4 шт., **Тандем**, 10 мл – 2 шт., **інструкція** – 1 шт., **рукавиці** – 1 шт., **респіратор** – 1 шт.

GreenBox для декоративних

Комплекс для захисту декоративних хвойних та листяних культур від шкідників і хвороб



Культура. Туя, ялівець, бруслина,

самшит, падуб та інші

Кількість. 5 хвойних, 2-3 листяних

дерева, 5 листяних кущів

Об'єм робочого розчину

на обробку. 10-20 л

Кількість обробок за сезон.

3-6 – хвойні, 3-5 – декоративні



Детальніше тут

Вміст:

Антихрущ, 10 мл – 4 шт., **Ато Жук**, 3 мл + **Авангард Стимул**, 10 мл – 2 шт., **Гудвін**, 5 мл + **Авангард Гроу Аміно**, 10 мл – 3 шт., **Ескаліп**, 7,5 мл – 4 шт., **Антигусінь**, 4 мл + **Самшит**, 3 мл – 2 шт., **Гарт**, 30 г – 4 шт., **Сільвер**, 30 мл – 2 шт., **Тандем**, 10 мл – 4 шт., **інструкція** – 1 шт., **рукавиці** – 1 шт., **респіратор** – 1 шт.

Готовий
комплекс



Захист
на весь сезон



Економія
коштів і часу



Чому GreenBox?

GreenBox – це готовий комплекс для захисту культур від шкідників, хвороб і бур'янів та для підживлення. Цей унікальний продукт створений спеціально для українських садівників, щоб забезпечити максимальний захист і підживлення дерев від весни до пізньої осені.

Гарантія
якості



Простота
використання



Ідеальний
подарунок





Обирайте GreenBox – і ваші культури будуть здоровими та захищеними протягом усього сезону й радуватимуть вас щедрим урожаєм!

Визначайте препарат за кольором

інсектициди

від шкідників

ад'юванти

для поліпшення дії ЗЗР

гербіциди

від бур'янів



Піклуємось про зерняткові

(яблуня, груша, айва)



Відеоінструкція

Основні шкідники та хвороби



Оленка волохата

АЦ Люкс® Ліквід



Плодожерка (види)

Антикоррад® Макс, Ато Жук®, АЦ Люкс®
Ліквід, Гудвін®, Фас®, Антигусінь® + Самшит®,
Туріл®*



Попелиця (види)

Антикоррад® Макс, Ато Жук®, АЦ Люкс®
Ліквід, Гудвін®, Фас®, Антигусінь® + Самшит®*



Парша

Віоліс®, Гарт®, Джек Пот®, Захисник®,
Страж®, Антигусінь® + Самшит®,
Феномен® Прайм®



Борошниста роса


Джек Пот®, Захисник®, Інферно®, Страж®*



Плодова гниль

Гарт®, Захисник®, Страж®, Феномен®
Прайм®

Комплексна система захисту зерняткових (яблуня, груша, айва)



1 Спляча брунька

Шкідники: зимуючі стадії шкідників (яйця кліщів, попелиці), щитівки
Хвороби: парша, бактеріальний опік, бура плямистість, моніліоз

Захват Ойл, 1.5-2% (150-200 мл) +
Віоліс, 20 мл (або **Гарт**, 30 г)
на 8-10 л води



2 Зелений конус

Шкідники: яблуневий квіткоїд, букарка, довгоносик, попелиці
Хвороби: парша, борошниста роса, моніліоз

Страж, 3 г + **Антигуси́нь**, 4 мл (або **Фас**, 2-2.5 мл) на 5-8 л води
Ґрунтові шкідники: **Антихрущ**, 10-15 мл на 5 л води




3 Рожевий бутон

Шкідники: яблуневий квіткоїд, кліщі, листоблішки, попелиці, листовійки

Хвороби: парша, борошниста роса, бура плямистість

Інферно, 60 г + **Захисник**, 14-16 мл +
Антиколорад Макс, 2-2.5 мл на 8-10 л води



4 Цвітіння

Шкідники: оленка волохата, квіткоїд, попелиці та інші

Хвороби: парша, борошниста роса, моніліоз

Феномен Прайм, 25 г або **Страж**, 3 г +
АЦ Люкс Ліквід, 5 мл на 5-8 л води



5 Кінець цвітіння

Шкідники: яблуневий пильщик, попелиці, листоблішки та інші

Хвороби: борошниста роса, парша, альтернаріоз

Антигуси́нь, 4 мл + **Самшит**, 3 мл на 5-8 л води. **Кліщі:** **Антикліщ Про**, 10 мл + **Авангард НРК + М/Е**
Плодово-ягідні, 30 мл на 5-8 л води



6 Лісовий горіх

Шкідники: попелиці, молі, яблуневий пильщик, букарка та ін.

Хвороби: парша, борошниста роса, альтернаріоз

Ато Жук, 1.5 мл + **Джек Пот**, 2-4 мл +
Інгрес, 4 мл на 5-8 л води.
Через 3-4 дні проти плодожерки:
Туріл, 2-2.5 г на 8 л води



7 Волоський горіх

Шкідники: попелиці, пильщик

Хвороби: парша, борошниста роса, альтернаріоз

Антигуси́нь, 4 мл + **Самшит**, 3 мл та
Авангард НРК + М/Е Плодово-ягідні, 30 мл на 5-8 л води. **Кліщі:** **Ескаліп**, 5-7.5 мл на 8-10 л води



8 Ріст плодів

Шкідники: яблунева плодожерка, мінуючі молі, листовійки

Хвороби: парша, борошниста роса, альтернаріоз

Туріл, 2-2.5 г + **Джек Пот**, 2-4 мл +
Авангард НРК + М/Е Плодово-ягідні, 30 мл на 5-8 л води



9 Дозрівання плодів

Хвороби: плодові гнілі, парша

Феномен Прайм, 25 г на 5-8 л води



10 Після збирання врожаю

Хвороби: парша, рак, бурі плямистості, бактеріози

Гарт, 30 г на 8-10 л води



11 Осінньо-зимовий період

Шкідники: мишоподібні гризуни (окрім видів, що охороняються законом)

Багіра, 2-3 брикети в кожен нірку (або 20 г зернової суміші) або
Капкан, 2-3 брикети/пакети в кожен нірку (або 5 г зернової суміші)



Для покращення ефективності дії препаратів додавати **Тандем®** або **Інгрес®**

Детальніше про застосування препаратів Ви можете дізнатися на сайті: apteka-sadivnyka.ua


Піклуємось про кісточкові

(вишня, черешня, слива)



Відеоінструкція

Основні шкідники та хвороби



Вишнева муха

Антиколорад® Макс, Ато Жук®, Гудвін®, Туріл®*



Сливовий чорний пильщик

Антиколорад® Макс, Ато Жук®, Гудвін®*



Сірий бруньковий довгоносик

Антиколорад Макс®, Ато Жук®, Гудвін®, Фас®*



Кокомікоз

Віоліс®, Гарт®, Захисник®, Страж®*



Моніліоз (плодова гниль)

Віоліс®, Гарт®, Джек Пот®, Захисник®, Страж®,
Феномен® Прайм*



Іржа

Антигусинь® + Самшит®

Комплексна система захисту кісточкових (вишня, черешня, слива)



1 До розпускання бруньок

Шкідники: зимуючі стадії кліщів, яйця попелиць, каліфорнійська та інші види щитівок

Хвороби: моніліоз, кокомікоз, клястероспоріоз, бактеріальний опік, бактеріальний рак

Захват Ойл, 1,5-2% (150-200 мл) + **Віоліс**, 20-30 мл (або **Гарт**, 30 г) на 8-10 л води



2 Зелений конус – перші листки

Шкідники: бруньковий довгоносик, попелиці

Хвороби: кокомікоз, клястероспоріоз, моніліальний опік

Страж, 3 г + **Антиколорад Макс**, 2-2.5 мл на 5-8 л води
Грунтові шкідники: Антихруц, 10-15 мл на 5 л води



3 Поява суцвіть

Шкідники: бруньковий довгоносик, попелиці, листогризучі шкідники

Хвороби: моніліоз, кокомікоз, клястероспоріоз, борошниста роса

Захисник, 14 мл + **Ато Жук**, 1,5 мл на 5-8 л води



4 Кінець цвітіння

Шкідники: оленка волохата, попелиці, пильщики, листовійки, вишневий довгоносик

Хвороби: моніліоз, клястероспоріоз, кокомікоз

Феномен Прайм, 25 г або **Страж**, 3 г + **АЦ Люкс Ліквід**, 5 мл + **Авангард NPK + M/E Плодово-ягідні**, 30 мл на 5-8 л води




5 Ріст плодів

Шкідники: вишнева муха, попелиці, пильщики

Хвороби: кокомікоз, плямистості листя, іржа

Антигусін, 4 мл + **Самшит**, 3 мл + **Авангард NPK + M/E Плодово-ягідні**, 30 мл на 5-8 л води

Кліщі: Ескаліп, 5-7.5 мл на 8-10 л води



6 Ріст плодів

Шкідники: вишнева муха, молі, вишнева листовійка, сливова плодохерка

Туріл, 2-2.5 г на 8-10 л води.
Обприскування проводять через 10-14 днів після попередньої обробки на сортах пізнього строку дозрівання



7 Після збирання врожаю

Хвороби: кокомікоз, моніліоз, бактеріальний рак

Вирізання уражених гілок, профілактичне обприскування:

Віоліс, 20-30 мл або **Гарт**, 30 г на 8-10 л води



8 Осінньо-зимовий період

Шкідники: мишоподібні гризуни (окрім видів, що охороняються законом)

Багіра, 2-3 брикети в кожному нірку (або 20 г зернової суміші) або **Капкан**, 2-3 брикети/пакети в кожному нірку (або 5 г зернової суміші)



Для покращення ефективності дії препаратів додавати **Тандем®** або **Інгрес®**.
Детальніше про застосування препаратів Ви можете дізнатися на сайті:

apteka-sadivnyka.ua

Піклуємось про кісточкові

(абрикос, персик, нектарин)



відеоінструкція

Основні шкідники та хвороби



Попелиця (види)

Антиколорад® Макс, Ато Жук®, Гудвін®, Фас®, Антигусінь® + Самшит®*



Плодожерка (види)

Антиколорад Макс®, Ато Жук®, Гудвін®, Фас®, Антигусінь® + Самшит®, Туріл®*



Личинки хрущів

Антихрущ®



Кучерявість листя

Віоліс®, Гарт®, Джек Пот®, Захисник®, Страж®, Антигусінь® + Самшит®, Феномен® Прайм®



Моніліоз (плодова гниль)


Гарт®, Захисник®, Страж®, Феномен® Прайм®



Клястероспоріоз (дірчаста плямистість)

Віоліс®, Гарт®, Страж®, Феномен® Прайм®

Комплексна система захисту кісточкових (абрикос, персик, нектарин)



1 До розпускання бруньок

Шкідники: зимуючі стадії кліщів, яйця попелиць, каліфорнійська та інші види щитівок

Хвороби: моніліоз, кокомікоз, клястероспоріоз, парша, бактеріальний опік, бактеріальний рак

Захват Ойл, 1.5-2% (150-200 мл) + **Віоліс**, 20-30 мл (або **Гарт**, 30 г) на 8-10 л води



2 Розпускання бруньок

Шкідники: брунькоїд, букарка, казарка, попелиці

Хвороби: борошниста роса, парша, моніліоз, кокомікоз, кучерявість листя

Страж, 3 г + **Антиколорад Макс**, 2-2.5 мл на 5-8 л води
Ґрунтові шкідники: Антихрущ, 10-15 мл на 5 л води



3 Кінець цвітіння – поява листків

Шкідники: плодожерка, попелиці, плодова міль

Хвороби: моніліальний опік, бура плямистість, кучерявість листя

Захисник, 14-16 мл + **Ато Жук**, 1.5-2.0 мл + **Авангард NPK + M/E** **Плодово-ягідні**, 30 мл на 5-8 л води



4 Ріст плодів

Шкідники: попелиці, листовійки, молі
Хвороби: парша, бура плямистість, борошниста роса, кучерявість листя

Антигусінь, 4 мл + **Самшит**, 3 мл + **Авангард NPK + M/E** **Плодово-ягідні**, 30 мл на 5-8 л води

Кліщі: Ескаліп, 5-7.5 мл на 8-10 л води



5 Ріст плодів

Шкідники: плодожерка, попелиці, мінуючі молі

Хвороби: плямистості листя, борошниста роса, моніліоз, кучерявість листя

Феномен Прайм, 25 г або **Страж**, 3 г + **АЦ Люкс Ліквід**, 5 мл + **Авангард NPK + M/E** **Плодово-ягідні**, 30 мл на 5-8 л води

Обприскування проводять через 10-14 днів після попередньої обробки



6 Дозрівання плодів

Шкідники: плодожерки, мінуючі молі, листовійки

Хвороби: плодова гниль, парша

Туріл, 2.0-2.5 г + **Захисник**, 14-16 мл + **Авангард NPK + M/E** **Плодово-ягідні**, 30 мл на 8-10 л води

Обробку проводять за 20-30 днів до збору врожаю




7 Після збирання врожаю

Хвороби: кокомікоз, моніліоз, бактеріальний рак

Вирізання уражених гілок, профілактичне обприскування:

Віоліс, 20-30 мл або **Гарт**, 30 г на 8-10 л води



8 Осінньо-зимовий період

Шкідники: мишоподібні гризуни (окрім видів, що охороняються законом)

Багіра, 2-3 брикети в кожну нірку (або 20 г зернової суміші) або

Капкан, 2-3 брикети/пакети в кожну нірку (або 5 г зернової суміші)



Для покращення ефективності дії препаратів додавати **Тандем**® або **Інгрес**®
Детальніше про застосування препаратів Ви можете дізнатися на сайті:

apteka-sadivnyka.ua

Піклуємось про ягідні

(полуниця, малина,
смородина та інші)



відеоінструкція



Основні шкідники та хвороби



Малинний довгоносик

Антиколорад[®] Макс[®], Ато Жук[®]*, Гудвін[®]*



Червоносмородинна попелиця

Антиколорад[®] Макс[®], Ато Жук[®], Гудвін[®],
Антигусінь[®] + Самшит[®]*



Кліщі (види)

Антикліщ[®] Про, Ескаліп[®], Інферно[®]
(додаткова дія за максимальних норм)*



Сіра гниль

Захисник[®], Страж[®]*



Антракноз

Захисник[®], Тройсет[®], Антигусінь[®] + Самшит[®]*



Бура плямистість

Джек Пот[®], Антигусінь[®] + Самшит[®], Страж[®]*

Комплексна система захисту полуниці



1 Рано навесні

Шкідники: ґрунтові шкідники (личинки хруща, дротяники)

Антихрущ, 10 мл на 5 л води.
Проливання ґрунту




3 Бутонізація

Шкідники: сунічний кліщ, малинний довгоносики, сунічний листоїд, пильщики

Хвороби: сіра гниль, борошниста роса
Антикорорад Макс, 1 мл + **Захисник**, 12-14 мл + **Авангард NPK+M/E Плодово-ягідні**, 30 мл на 5 л води на сотку

Кліщі: **Антикліщ Про**, 8-10 мл або **Ескаліп**, 4-6 мл на 5-8 л води на сотку



5 Після збору ягід

Шкідники: ґрунтові шкідники (личинки хрущів, дротяники, ведмедка)

Полив під корінь: **Антихрущ** із розрахунку 10 мл на 5 л води
Бур'яни: однорічні дводольні та злакові види: **Мастак**, 3,5 мл + **Мортал**, 10 мл на 3-5 л води на сотку



7 Кінець липня – початок серпня

Однорічні та багаторічні бур'яни
Підготовка площ під закладку насаджень: **Гліфовіт Екстра**, 20-35 мл або **Антибур'ян**, 30-50 мл на 3 л води на сотку



9 Після укорінення рослин

Однорічні та деякі багаторічні дводольні види бур'янів
Мастак, 3,5 мл на 3-5 л води на сотку або **Мастак**, 3,5 мл + **Мортал**, 10 мл на 3-5 л води на сотку



2 Відростання розетки

Шкідники: довгоносики, листоїди, пильщики

Хвороби: сіра гниль, борошниста роса, плямистості листя

Ато Жук, 1,5 мл + **Страж**, 9 г + **Авангард NPK + M/E Плодово-ягідні**, 30 мл на 5 л води на сотку


Бур'яни: **Мастак**, 3,5 мл + **Мортал**, 10 мл на 3-5 л води на сотку



4 Кінець цвітіння

Шкідники: довгоносики, пильщики

Хвороби: сіра гниль, борошниста роса, бура та біла плямистості
Страж, 4,5 г + **АЦ Люкс Ліквід**, 5 мл + **Авангард NPK + M/E Плодово-ягідні**, 30 мл на 3-5 л води на сотку
Кліщі: **Антикліщ Про**, 8-10 мл або **Ескаліп**, 4-6 мл на 5-8 л води на сотку



6 Після збору ягід

Шкідники: сунічний кліщ

Хвороби: сіра гниль, борошниста роса, бура та біла плямистості
Антикліщ Про, 8-10 мл + **Страж**, 9 г на 5 л води на сотку
Однорічні та багаторічні злакові види бур'янів: **Антипірій**, 15-20 мл на 3-5 л води на сотку
Однорічні та деякі багаторічні дводольні види бур'янів: **Мастак**, 3,5 мл на 3-5 л води на сотку
Гербіциди вносять окремо від фунгіцидів та інсектицидів



8 Через 14-21 день

Шкідники: ґрунтові шкідники (личинки хрущів, дротяники, ведмедка)

Хвороби: кореневі гнилі, вертицильоз, фітофтороз

Антихрущ, 20-30 мл та **Фундазим**, 20 г (або **Енергодар**, 60 мл). Суміш розрахована для обробки 60 фланців)



Для покращення ефективності дії препаратів додавати **Тандем®** або **Інгрес®**
Детальніше про застосування препаратів Ви можете дізнатися на сайті:

apteka-sadivnyka.ua

Комплексна система захисту малини



1 До початку вегетації

Зимуючі стадії збудників хвороб і шкідників

Захват Ойл, 1,5-2% (150-200 мл) + **Віоліс**, 20-30 мл на 8-10 л (або **Гарт**, 30 г на 10 л води)



2 Посадка саджанців

Шкідники: ґрунтові шкідники (личинки хрущів, дротянки)

Антихрущ, 20-30 мл та **Фундазим**, 20 г. Суміш розрахована для обробки 50-60 саджанців



3 Розпускання бруньок

Шкідники: пагонова попелиця, малинний жук, пильщики, малинна муха

Хвороби: пурпурова плямистість, сіра гниль

Ато Жук, 1,5 мл на 3-5 л води + **Страж**, 6 г на 5-8 л води на сотку



4 Відокремлення бутонів

Шкідники: попелиці, малинний довгоносик, малинний жук, кліщі, пильщики

Хвороби: пурпурова плямистість, іржа, антракноз

Антигуси́нь, 4 мл + **Самшит**, 3 мл на 5-8 л води на сотку

Кліщі: **Антикліщ Про**, 8-9 мл або **Ескаліп**, 4-6 мл на 5-8 л води на сотку



5 Перед цвітінням

Шкідники: попелиці, малинний довгоносик, малинний жук, галиця

Хвороби: пурпурова плямистість, сіра гниль

Страж, 3 г + **АЦ Люкс Ліквід**, 5 мл на 3-5 л води + **Авангард NPK + M/E Плодово-ягідні**, 30 мл на 5-8 л води на сотку



6 Після цвітіння – формування ягід

Шкідники: малинна галиця

Хвороби: антракноз, пурпурова плямистість

Вирізання та спалювання потовщених зів'ялих пагонів. Раз на 10 днів.

Захисник, 12 мл + **Фас**, 2,5 мл + **Авангард NPK + M/E Плодово-ягідні**, 30 мл на 5-8 л води на сотку




7 Після збору ягід

Хвороби: пурпурова плямистість

Страж, 6 г на 5-8 л води на сотку

Злакові бур'яни: **Антипірій**, 15-20 мл або **Квін Стар Макс**, 6-12 мл на 3-5 л води на сотку (унікати попадання на малину)

Ґрунтові шкідники: **Антихрущ**, 10 мл на 5 л води



8 Листопад-грудень

Зимуючі стадії збудників хвороб і шкідників

Захват Ойл, 1,5-2% (150-200 мл) + **Віоліс**, 20-30 мл на 8-10 л води (або **Гарт**, 30 г на 10 л води)

Зрізання та спалювання старих стебел



Для покращення ефективності дії препаратів додавати **Тандем®** або **Інгрес®**

Детальніше про застосування препаратів Ви можете дізнатися на сайті:

apteka-sadivnyka.ua

Комплексна система захисту чорної смородини, порічок та агрусу

1 До набрякання бруньок



Шкідники: зимуючі стадії кліщів, попелиць і збудники хвороб

Захват Ойл, 1.5–2% (150–200 мл) + **Віоліс**, 20–30 мл на 8–10 л води (або **Гарт**, 30 г на 10 л води)

2 Розпускання бруньок — початок цвітіння



Шкідники: попелиці, пильщики, галиця, кліщ

Хвороби: борошниста роса

Антикліщ Про, 9 мл + **Фас**, 1.5–2.0 мл на 5–8 л води + **Захисник**, 15 мл на 8–10 л води (або **Інферно**, 60 г на 5–8 л води) на сотку

3 Кінець цвітіння



Шкідники: смородинний бруньковий кліщ, попелиці, пильщики, галиця

Хвороби: борошниста роса, антракноз

Ескаліп, 6 мл + **Ато Жук**, 3 мл + **Авангард Стимул**, 10 мл на 10 л води + **Захисник**, 14 мл на 5–8 л води + **Авангард NPK + M/E Плодово-ягідні**, 30 мл на 5–8 л води
Злакові бур'яни: **Антипирій**, 15–20 мл або **Квін Стар Макс**, 6–12 мл на 3–5 л води на сотку (уникати попадання на культурні рослини)

4 Ріст ягід



Шкідники: попелиці, смородинна склівка, пильщики

Хвороби: борошниста роса, іржа, антракноз

Антигусінь, 4 мл + **Самшит**, 3 мл + **Авангард NPK + M/E Плодово-ягідні**, 30 мл на 5–8 л води на сотку

5 Після збору ягід



Шкідники: попелиці, пильщики
Хвороби: борошниста роса, іржа, антракноз

Антигусінь, 4 мл + **Самшит**, 3 мл на 5–8 л води на сотку

6 Листопад-грудень



Збудники хвороб і зимуючі стадії шкідників

Обрізка та спалювання уражених хворобами і пошкоджених склівкою стебел



Для покращення ефективності дії препаратів додавати **Тандем**[®] або **Інгрес**[®]

Детальніше про застосування препаратів Ви можете дізнатися на сайті:

apteka-sadivnyka.ua

Піклуємось про виноград



відеоінструкція

Основні шкідники та хвороби



Гронова листовійка

Антиколорад® Макс, Ато Жук®, Гудвін®, Туріл®*



Філоксера (листова форма)

Антиколорад® Макс, Ато Жук®, Гудвін®, Ескаліп®*



Кліщі (види)

Антикліщ Про®, Ескаліп®, Інферно®
(додаткова дія за максимальних норм)*



Сіра гниль

Захисник®, Страж®, Феномен® Прайм,
Цілитель®*



Мілдью (несправжня борошниста роса)

Віоліс®, Гарт®, Страж® (опосередкована дія),
Тройсет®, Феномен® Прайм, Цілитель®*



Оїдіум (борошниста роса)

Джек Пот®, Захисник®, Інферно®, Страж®,
Антигусін® + Самшит®, Тройсет®*

Комплексна система захисту винограду

1 Спляча брунька



Шкідники: зимуючі стадії кліщів, попелиць, червців, молей, щитівок
Хвороби: мільдю

Захват Ойл, 1,5–2% розчин (150–200 мл) + **Віоліс**, 25–35 мл на 8–10 л води (або **Гарт**, 30 г на 10 л води)

3 Розпускання бруньок – перші листки



Шкідники: скосар, філоксера (листова форма)

Хвороби: оїдіум, сіра гниль

Антиколорад Макс, 2–2,5 мл + **Захисник**, 15 мл на 5–8 л води

5 Перед цвітінням



Шкідники: гронова листовійка, виноградна листовійка
Хвороби: оїдіум, чорна плямистість

Антигусін, 4 мл (або **Туріл**, 1,5–2 г) + **Самшит**, 3 мл (або **Джек Пот**, 2,5–4 мл) + **Авангард НРК + М/Е Виноград**, 15–30 мл на 5–8 л води


7 Ріст ягід



Шкідники: гронова листовійка, виноградна листовійка
Хвороби: оїдіум, мільдю, сіра гниль

Страж, 7–10 г (опосередкована дія проти мільдю) + **Туріл**, 1,5–2 г + **Авангард НРК + М/Е Виноград**, 15–30 мл на 5–8 л води

9 Ріст ягід



Шкідники: гронова листовійка, виноградна листовійка
Хвороби: мільдю

Феномен Прайм, 25 г (або **Гарт**, 30 г) + **Туріл**, 1,5–2,0 г + **Авангард НРК + М/Е Виноград**, 15–30 мл на 5–8 л води

11 Після збору врожаю



Зимуючі стадії збудників хвороб і шкідників

Захват Ойл, 40 мл + **залізний купорос**, 500 г (або **Віоліс**, 25–35 мл) на 10 л води

2 Розпускання бруньок – перші листки



Однорічні та багаторічні бур'яни: **Гліфовіт Екстра**, 20–35 мл або **Антибур'ян**, 30–50 мл на 3 л води на сотку

Направлене обприскування по бур'янах, уникаючи попадання робочого розчину на насадження

4 Поява суцвіть



Шкідники: скосар, філоксера (листова форма), листовійки
Хвороби: оїдіум, мільдю

Фас, 2,5 мл + **Цілитель**, 25 г (або **Інферно**, 60 г) на 5–8 л води

6 Після цвітіння



Шкідники: виноградний зудень, павутинний кліщ
Хвороби: мільдю, оїдіум, чорна плямистість

Ескаліп, 5–6 мл + **Цілитель**, 25 г (або **Тройсет**, 20–25 г) + **Авангард НРК + М/Е Виноград**, 15–30 мл на 5–8 л води


8 Ріст ягід



Шкідники: кліщі
Хвороби: оїдіум, мільдю, краснуха

Антикліщ Про, 10 мл + **Тройсет**, 20–25 г (або **Інферно**, 60 г) + **Авангард НРК + М/Е Виноград**, 15–30 мл на 8–10 л води

10 Дозрівання



Хвороби: сіра гниль, мільдю, оїдіум

Захисник, 15 мл + **Цілитель**, 25 г (або **Інферно**, 60 г) + **Авангард НРК + М/Е Виноград**, 15–30 мл на 5–8 л води



Для покращення ефективності дії препаратів додавати **Тандем®** або **Інгрес®**
Детальніше про застосування препаратів Ви можете дізнатися на сайті:

apteka-sadivnyka.ua

Піклуємось про волоський горіх



Відеоінструкція

Основні шкідники та хвороби



Американський білий метелик

Антиколорад® Макс, Ато Жук®*
(обробка в період льоту метеликів)



Кліщ горіховий повстяний

Захват® Ойл (рано навесні), Антикліщ® Про,
Ескаліп®, Інферно® (додаткова дія)*



Горіхова попелиця

Антиколорад® Макс, Ато Жук®,
Гудвін®, Фас®*



Бактеріоз

Віоліс® або Гарт® (профілактично)



Бура плямистість (марсоніоз)

Віоліс® або Гарт® (профілактично), Захисник®,
Страж®, Антигуснь® + Самшит®*



Біла плямистість

Віоліс® або Гарт® (профілактично), Захисник®,
Страж®*

Комплексна система захисту волоського горіха

1 До розпускання бруньок



Шкідники: горіховий галовий кліщ, кліщ повстаний горіховий, горіхова попелиця та інші
Хвороби: бактеріоз, антракноз, марсоніоз
Захват Ойл, 150-200 мл + **Віоліс**, 20-30 мл на 8-10 л води (або **Гарт**, 30 г на 10 л води)

2 Набрякання термінальних бруньок



Хвороби: бактеріоз, антракноз, марсоніоз

3 Розпускання бруньок



Шкідники: ґрунтові шкідники (личинки хрущів, дротяників і несправжніх дротяників, гусениці підгризаючих совок, капустянка), попелиці
Прикореневий полив – **Антихрущ**, 10 мл на 5 л води

4 Відростання пагонів 3-5 см



Однорічні та багаторічні види бур'янів: **Антибур'ян**, 30-50 мл або **Гліфовіт Екстра**, 20-35 мл на 2-3 л води на сотку
Направлене обприскування по бур'янах без попадання на культурні насадження

5 Відокремлення жіночих суцвіть




Шкідники: горіховий довгоносик, сірий бруньковий довгоносик, попелиця (види), горіхова міль
Хвороби: антракноз, бура та біла плямистості
Страж, 3 г + **Авангард Стимул**, 10 мл + **Антиколорад Макс**, 2-2.5 мл на 5-8 л води

6 Перед поч. цвітіння жіночих суцвіть



Шкідники: горіховий галовий кліщ, кліщ повстаний горіховий, попелиця (види)
Хвороби: борошниста роса, біла та бура плямистості
Антикліщ Про, 9-10 мл + **Захисник**, 15 мл + **Авангард НРК + М/Е** **Плодово-ягідні**, 30 мл на 8-10 л води

7 Перед поч. цвітіння чоловічих суцвіть



Шкідники: горіховий довгоносик, сірий бруньковий довгоносик, попелиця (види), горіхова міль
Хвороби: біла та бура плямистості, борошниста роса
Страж, 3 г + **АЦ Люкс Ліквід**, 5 мл + **Авангард НРК + М/Е Плодово-ягідні**, 30 мл на 5-8 л води

8 Через 2 тижні після зав. цвітіння




Шкідники: буйволова цикадка, листокруткі, горіхова міль, американський білий метелик
Хвороби: борошниста роса, сіра гниль, біла та бура плямистості
Ато Жук, 1.5-2.0 мл + **Страж**, 3-4.5 г (або **Цілитель**, 25 г) + **Авангард НРК + М/Е Плодово-ягідні**, 30 мл на 5-8 л води

9 Ріст плодів до повного розміру



Шкідники: листокруткі, попелиця (види), яблунева плодожерка, горіховий довгоносик
Хвороби: борошниста роса, антракноз, сіра гниль
Фас, 2.0-2.5 мл + **Гарт**, 30 г + **Захисник**, 15 мл + **Авангард НРК + М/Е Плодово-ягідні**, 30 мл на 8-10 л води

10 Фаза повного розвитку плодів



Шкідники: горіхова попелиця, яблунева плодожерка, американський білий метелик, горіхова міль
Антиколорад Макс, 2.0 мл + **ПАР Тандем**, 10 мл на 8-10 л води; **Авангард НРК + М/Е Плодово-ягідні**, 30 мл на 5-8 л води

11 Через 2 тижні після збору врожаю



Авангард Стимул, 10-15 мл + **Авангард НРК + М/Е Плодово-ягідні**, 30 мл на 5-8 л води

12 До опадання листя



Хвороби: бактеріальний опік, марсоніоз, біла плямистість

Віоліс, 20-30 мл на 8-10 л води або **Гарт**, 30 г на 10 л води

Піклуємось про пасльонові

(картопля, томати, перець
солодкий, баклажани)



відеоінструкція



Основні шкідники та хвороби



Колорадський жук

Антиколорад® Макс, Ато Жук®,
АЦ Люкс® Ліквід, Гудвін®, Фас®*



Дротяник

Антихрущ®, АС-Селектив®, Матадор®,
АС-Кольд® Дуо*



Травневий хрущ

Антихрущ®, АС-Селектив®, Матадор®,
АС-Кольд® Дуо*



Фітофтороз

Віоліс®, Гарт®, Енергодар®, Тройсет®,
Цілитель®*



Альтернаріоз (суха плямистість)

Віоліс®, Гарт®, Захисник®, Тройсет®,
Цілитель®, Антигусинь® + Самшит®*




Звичайна парша

АС-Селектив®

Комплексна система захисту картоплі

1 Серпень-вересень



Багаторічні дводольні та злакові види бур'янів: осот рожевий, пирій повзучий, берізка польова та інші

Гліфовіт Екстра, 20-35 мл або **Антибур'ян**, 30-50 мл на 3 л води на сотку

Підготовка площ під посадку картоплі: восени після збирання врожаю попередника

3 До появи сходів



Однорічні дводольні та окремі злакові бур'яни: лобода біла, мишій сизий, галінсога дрібноквітка, щириця звичайна, редька дика

Антисапа Ліквід, 5-12 мл або **Антисапа**, 5-15 г, або **Селефіт**, 30-40 мл на 4-5 л води, або **Варяг**, 40-45 мл на 2-3 л води на сотку (через 2-3 дні після посадки)

5 Бутонізація – початок цвітіння



Шкідники: колорадський жук, попелиця
Хвороби: фітофтороз, альтернаріоз
Антиколарад Макс, 1 мл + **Тройсет**, 20-25 г + **Авангард НРК + М/Е Овочеві**, 15-30 мл на 3-5 л води на сотку

7 Ріст рослин



Шкідники: колорадський жук
Хвороби: фітофтороз, альтернаріоз
Гудвін, 2.5 мл + **Тройсет**, 20-25 г (або **Цілитель**, 25 г) + **Авангард НРК + М/Е Овочеві**, 15-30 мл на 3-5 л води на сотку (за 20 днів до збирання)

2 До посадки (обробка бульб)



Шкідники: личинки хруща, дротяники, несправжні дротяники, колорадський жук, попелиця
Хвороби: альтернаріоз, фузаріоз, ризоктоніоз, парша

АС-Кольд Дуо, 20 мл або **Матадор**, 30 мл, або **АС-Селеktiv**, 30 мл на 400-500 мл води на 30 кг бульб

Бульби обробляють безпосередньо перед посадкою ранцевим або ручним обприскувачем

4 Сходи, ріст рослин



Шкідники: колорадський жук, попелиця

Антиколарад Макс, 1 мл або **Ато Жук**, 1.5 мл на 3-5 л води на сотку
Злакові бур'яни: **Антипірій**, 10-20 мл на 3-5 л води або **Квін Стар Макс**, 6-12 мл на 2-3 л води на сотку

Дводольні та деякі злакові: **Антисапа Ліквід**, 5-6 мл або **Антисапа**, 5-10 г на 3-5 л води на сотку
Гербіциди вносити окремо!

6 Цвітіння




Шкідники: колорадський жук, попелиця
Хвороби: фітофтороз, альтернаріоз
Ато Жук, 1.5 мл + **Тройсет**, 20-25 г (або **Цілитель**, 25 г) + **Авангард НРК + М/Е Овочеві**, 15-30 мл на 5 л води на сотку (через 10-14 днів після попередньої обробки)



Для покращення ефективності дії препаратів додавати **Тандем®** або **Інгрес®**
Детальніше про застосування препаратів Ви можете дізнатися на сайті:
apteka-sadivnyka.ua

Комплексна система захисту томатів

1 Серпень–вересень



Багаторічні дводольні та злакові види бур'янів: осот рожевий, пирій повзучий, берізка польова та інші

Гліфовіт Екстра, 20–35 мл або **Антибур'ян**, 30–50 мл на 3 л води на сотку
Підготовка площ під посів/посадку томатів: восени після збирання врожаю попередника

2 Розсада (перед висаджуванням)



Шкідники: ґрунтові шкідники (личинки хруща, дротяники, підгризаючі совки), колорадський жук, попелиця

Антихрущ, 10 мл або **АС–Селектив**, 10 мл, або **АС–Кольд Дую**, 10–15 мл на 1 л води
Замочування кореневої системи розсади перед висаджуванням у ґрунт (1–4 години)

3 Розсада (перед висаджуванням)



Однорічні дводольні та деякі злакові бур'яни: лобода біла, мишій сизий, галінсога дрібноквіткова, щиріця звичайна та інші

Антисапа Ліквід, 6–8 мл або **Антисапа**, 10–15 г на 4–5 л води, або **Варяг**, 40–45 мл на 2–3 л води на сотку

4 Розсада (перед висаджуванням)



Шкідники: кореневі гнилі, чорна ніжка

Енергодар, 3 мл на 2 л води на 1 м², повторний полив через 7–10 дів після першого використання

5 Ріст рослин



Шкідники: колорадський жук, попелиця, трипс, совки
Хвороби: фітофтороз, альтернаріоз, бактеріальна плямистість

Антиколорад Макс, 1 мл + **Тройсет**, 20–25 г + **Авангард NPK + М/Е Овочеві**, 15–30 мл на 5 л води на сотку. Захист від бур'янів на с. 43

6 Бутонізація



Шкідники: совки, попелиці, трипс, колорадський жук
Хвороби: фітофтороз, альтернаріоз, кореневі гнилі

Антиколорад Макс, 1 мл (або **Гудвін**, 2,5 мл) + **Цілитель**, 25 г (або **Енергодар**, 30 мл) + **Авангард NPK + М/Е Овочеві**, 15–30 мл на 3–5 л води на сотку

7 Цвітіння – ріст плодів



Шкідники: совки, попелиці, колорадський жук
Хвороби: фітофтороз, альтернаріоз

Тройсет, 40–50 г + **Ато Жук**, 3,0 мл + **Авангард Стимул**, 10 мл + **Авангард NPK + М/Е Овочеві**, 30–60 мл на 6–10 л води на 2 сотки

8 Ріст плодів – дозрівання



Шкідники: совки, попелиці, колорадський жук
Хвороби: фітофтороз, альтернаріоз, септоріоз

Гарт, 30 г на 5–8 л води або **Цілитель**, 25 г на 5 л води, або **Антигусь**, 4 мл + **Самшит**, 3 мл + **Авангард NPK + М/Е Овочеві**, 15–30 мл на 3–5 л води на сотку

9 Ріст плодів – дозрівання



Шкідники: совки, трипси
Хвороби: фітофтороз, альтернаріоз

Віоліс, 20–25 мл на 5–8 л води + **Туріл**, 1,5–2,0 г на 3–5 л води на сотку



Для покращення ефективності дії препаратів додавати **Тандем®** або **Інгрес®**
Детальніше про застосування препаратів Ви можете дізнатися на сайті:

apteka-sadivnyka.ua

Комплексна система захисту перцю солодкого та баклажана

1 Серпень-вересень



Однорічні та багаторічні дводольні і злакові види бур'янів: осот рожевий, пірій повзучий, берізка польова та інші

Гліфовік Екстра, 20–35 мл або **Антибур'ян**, 30–50 мл на 3 л води на сотку
Підготовка площ під посів перцю та баклажанів: восени після збирання врожаю попередника

3 Розсада (після висаджування)



Захист від кореневих гнилей та рістстимулююча дія

Енергодар, 6 мл на 2 л води на 1 м²
Пролив ґрунту (повторний полив через 7–10 діб після першого використання)

5 Ріст рослин



Однорічні та багаторічні злакові види бур'янів: пірій повзучий, вівсюг, мишій сизий та інші

Антипірій, 15–20 мл на 3–5 л води або **Квін Стар Макс**, 6–12 мл на 2–3 л води на сотку

7 Бутонізація – початок цвітіння



Шкідники: листогризучі совки, попелиці
Хвороби: альтернаріоз, гнилі, плямистості, вертицильоз, антракноз

Фас, 2–2.5 мл або **Гудвін**, 1.5 мл + **Захисник**, 10–12 мл + **Авангард NPK + М/Е Овочеві**, 30 мл на 3–5 л води на сотку

2 Розсада (перед висаджуванням)



Шкідники: ґрунтові шкідники (личинки хруща, дротяники), колорадський жук, попелиці

Антихрущ, 10 мл або **АС-Селектив**, 10 мл, або **АС-Кольд Дуо**, 10–15 мл на 1 л води
Замочування кореневої системи розсади протягом 3–4 годин перед висаджуванням у ґрунт

4 Ріст рослин



Шкідники: колорадський жук, попелиці, трипс
Хвороби: фітофтороз, альтернаріоз

Гарт, 25 г на 5–8 л води + **Антиколорад Макс**, 1 мл + **Авангард NPK + М/Е Овочеві**, 30 мл на 3–5 л води на сотку

6 Ріст рослин



Шкідники: листогризучі совки, попелиця
Хвороби: фітофтороз, альтернаріоз
Цілитель, 50 г + **Ато Жук**, 3 мл + **Авангард Стимул**, 10 мл + **Авангард NPK + М/Е Овочеві**, 60 мл на 6–10 л води на 2 сотки.
Обприскування через 10–14 днів після попередньої обробки

8 Ріст плодів



Хвороби: фітофтороз, альтернаріоз

Цілитель, 25 г або **Енергодар**, 25 мл, або **Антигусинь**, 4 мл + **Самшит**, 3 мл на 3–5 л води на сотку
Додатково застосовують: **Авангард NPK + М/Е Овочеві**, 30 мл на 3–5 л води на сотку



Для покращення ефективності дії препаратів додавати **Тандем®** або **Інгрес®**

Детальніше про застосування препаратів Ви можете дізнатися на сайті:

apteka-sadivnyka.ua

Піклуємось про капусту



відеоінструкція

Основні шкідники та хвороби



Білан капустяний

Антиколорад® Макс, Ато Жук®, Гудвін®, Туріл®, Фас®*



Капустяна совка

Антиколорад® Макс, Ато Жук®, Гудвін®, Туріл®*



Хрестоцвіті блішки

Антиколорад® Макс, Ато Жук®, Гудвін®, Фас®*



Кила

Інферно®, Фундазим®*



Чорна ніжка

АС-Селектив®, Енергодар®*




Сіра гниль

Захисник®, Цілитель®*

Комплексна система захисту капусти

1 Серпень-вересень



Однорічні та багаторічні дводольні і злакові види бур'янів: осот рожевий, пирій повзучий, берізка польова та інші

Гліфовіт Екстра, 20-35 мл або **Антибур'ян**, 30-50 мл на 3 л води на сотку

Підготовка площ під посів/посадку капусти: восени після збирання врожаю попередника

3 За 7-14 днів до висаджування



Хвороби: пероноспороз (несправжня борошниста роса), кореневі гнилі

Енергодар, 15 мл на 10 л води

Оздоровлення розсади та захист від хвороб

5 5-6 листків



Шкідники: хрестоцвітні блішки, капустияна муха, попелиці, трипси

Антиколарад Макс, 1 мл на 3-5 л води на сотку

Інсектициди застосовують, якщо не замочували кореневу систему розсади

7 Утворення головки капусти



Хвороби: пероноспороз, альтернاریоз

Шкідники: білани, совка, капустияна міль, попелиця

Гудвін, 1,5-2,5 мл (або **Туріл**, 2,0 г) + **Тройсет**, 20-25 г або **Антигусинь**, 4 мл + **Самшит**, 3 мл + **Авангард НРК + М/Е Овочеві**, 30 мл на 3-5 л води на сотку

9 За 10 днів до збирання



Хвороби: сіра, біла гнилі, альтернاریоз

Цілитель, 25 г на 3-5 л води на сотку

2 До посіву (в парниках)



Хвороби: кила капусти

Фундазим, 10-15 г на 10 л води на 10 м², **Інферно**, 80-100 г на 2-3 л води на 10 м²
Обприскування ґрунту за день до висаджування розсади із заробкою у ґрунт

4 Висаджування розсади



Шкідники: дротяники, личинки хрущів, ведмедка, попелиця, хрестоцвітні блішки

Антихрущ, 10 мл або **АС-Селектив**, 10 мл, або **АС-Кольд Дуо**, 10-15 мл на 1 л води

Замочування кореневої системи розсади перед висаджуванням у ґрунт протягом 3-4 годин

6 Період вегетації



Однорічні та багаторічні злакові бур'яни: мишії сизий, пирій повзучий та інші

Антипірій, 10-20 мл на 3-5 л води або **Квін Стар Макс**, 6-12 мл на 2-3 л води на сотку

Дводольні бур'яни: осот (види), будяк, гірчак (види) та інші **Мастак**, 3,5 мл на 3-5 л води на сотку

8 Період вегетації



Шкідники: білани, совка, капустияна міль (друге покоління)

Антиколарад Макс, 2 мл + **Тандем**, 10 мл на 6-10 л води на 2 сотки + **Енергодар**, 30 мл на 5 л води на сотку + **Авангард НРК + М/Е Овочеві**, 15-30 мл на 3-5 л води на сотку



Для покращення ефективності дії препаратів додавати **Тандем**® або **Інгрес**®

Детальніше про застосування препаратів Ви можете дізнатися на сайті:

apteka-sadivnyka.ua

Піклуємось про гарбузові

(огірок, кавун, диня, гарбуз)



відеоінструкція

Основні шкідники та хвороби




Тютюновий трипс

Антикоррад® Макс, Антикліщ® Про, Ато Жук®, Гудвін®, Ескаліп®*



Звичайний павутинний кліщ

Антикліщ® Про, Інферно® (додаткова дія за максимальних норм), Ескаліп®*



Баштанна попелиця

Антикоррад® Макс, Ато Жук®, Гудвін®, Ескаліп®, Фас®*



Борошниста роса

Джек Пот®, Захисник®, Інферно®, Тройсет®*



Кореневі гнилі

АС-Селектив®, Енергодар®*




Пероноспороз

Віоліс®, Гарт®, Енергодар®, Тройсет®, Цілитель®*

Комплексна система захисту огірків (відкритого ґрунту)

1 Серпень-вересень



Однорічні та багаторічні дводольні і злакові види бур'янів: осот рожевий, пирій повзучий, берізка польова та інші

Гліфовіт Екстра, 20-35 мл або **Антибур'ян**, 30-50 мл на 3 л води на сотку
Підготовка площ під посів огірків: восени після збирання врожаю попередника

3 2-4 листки



Хвороби: борошниста роса

Захисник, 15 мл на 3-5 л води на сотку. Профілактична обробка

5 10-12 листків



Хвороби: пероноспороз, сіра гниль

Цилитель, 25 г + **Авангард NPK + M/E Овочеві**, 30 мл на 3-5 л води на сотку

7 Плодоношення




Шкідники: попелиці, трипси та інші

Хвороби: пероноспороз, борошниста роса, антракноз, сіра гниль

Захисник, 15 мл + **Енергодар**, 25 мл + **Фас**, 2 мл на 3-5 л води на сотку
Перед обприскуванням необхідно повністю зібрати сформовані плоди

2 Після висіву



Захист від кореневих гнилей

Енергодар, 3 мл на 2 л води на 1 м². Полив ґрунту після висівання

4 6-8 листків



Шкідники: попелиця, трипси, павутинний кліщ

Хвороби: борошниста роса, пероноспороз

Тройсет, 20-25 г + **Ато Жук**, 1,5 мл + **Авангард NPK + M/E Овочеві**, 30 мл на 3-5 л води на сотку
За наявності кліщів: **Антикліщ Про**, 7-10 мл на 5-8 л води або **Ескаліп**, 4-6 мл на 2,5-3,5 л води на сотку

6 Початок цвітіння



Хвороби: пероноспороз, борошниста роса, плямистості

Віоліс, 20-25 мл на 5-8 л води (або **Гарт**, 25 г на 3-5 л води) + **Антигусінь**, 4 мл + **Самшит**, 3 мл + **Авангард NPK + M/E Овочеві**, 30 мл на 3-5 л води на сотку

.....



Для покращення ефективності дії препаратів додавати **Тандем®** або **Інгрес®**
Детальніше про застосування препаратів Ви можете дізнатися на сайті:
apteka-sadivnyuka.ua

.....

Піклуємось про моркву



відеоінструкція



Основні шкідники та хвороби



Морквяна муха

Антиколорад® Макс, Ато Жук®, Гудвін®, Фас®*



Морквяна муха

Антиколорад® Макс, Ато Жук®, Гудвін®, Фас®*



Зонтична міль

Антиколорад® Макс, Ато Жук®, Гудвін®*



Чорна гниль (альтернаріоз)

Замочування насіння – АС-Селектив®, обробка фунгіцидами: Гарт®, Тройсет®, Цілитель®, Антигусінь® + Самшит®*



Борошниста роса

Антигусінь® + Самшит®, Захисник®, Інферно®, Тройсет®*




Біла гниль

Тройсет®, Цілитель®*

Комплексна система захисту моркви

1 Серпень-вересень




Однорічні та багаторічні дводольні і злакові види бур'янів: осот рожевий, пирій повзучий, берізка польова та інші

Гліфовіт Екстра, 20-35 мл або **Антибур'ян**, 30-50 мл на 3 л води на сотку

Підготовка площ під посів моркви: восени після збирання врожаю попередника

2 Після сівби – до появи сходів



Однорічні дводольні та деякі злакові бур'яни: галінсога дрібноквіткова, гірчиця польова, грицики звичайні, зірочник середній, портулак городній, редька дика, роман польовий, фіалка польова, лобода біла, щириця звичайна та інші

Селефіт, 30 мл на 3-5 л води на сотку

3 2-3 листки



Однорічні дводольні та однорічні і багаторічні злакові бур'яни:

галінсога дрібноквіткова, гірчиця польова, грицики звичайні, зірочник середній, портулак городній, редька дика, роман польовий, фіалка польова, лобода біла, щириця звичайна, пирій повзучий, мишії сизий

Антисапа Ліквід, 5 мл або **Селефіт**, 20 мл + **Антипирій**, 10-20 мл на 3-5 л води на сотку

4 4-6 листків (травень)



Шкідники: морквяна муха, морквяна листоблішка

Хвороби: борошниста роса, альтернаріоз

Антигусінь, 4 мл + **Самшит**, 3 мл на 3-5 л води на сотку

5 6-9 листків



Шкідники: морквяна муха, зонтична міль, морквяна листоблішка

Хвороби: альтернаріоз, борошниста роса, біла гниль

Тройсет, 20-25 г на 5 л води (або **Цілитель**, 25 г на 3-5 л води) + **Ато Жук**, 1,5-2 мл + **Авангард NPK + M/E Овочеві**, 30 мл на 3-5 л води на сотку



Для покращення ефективності дії препаратів додати **Тандем®** або **Інгрес®**

Детальніше про застосування препаратів Ви можете дізнатися на сайті:

apteka-sadivnyka.ua

Піклуємось про цибулю



відеоінструкція

Основні шкідники та хвороби



Цибулева муха

Антиколорад® Макс, Ато Жук®, Гудвін®, Фас®*



Цибулева муха

Антиколорад® Макс, Ато Жук®, Гудвін®, Фас®*



Цибулева міль

Антиколорад® Макс, Ато Жук®, Гудвін®*



Тютюновий трипс

Антиколорад® Макс, Антикліщ® Про, Ато Жук®, Гудвін®, Ескаліп®*



Пероноспороз

(неправжня борошниста роса)

Віоліс®, Гарт®, Енергодар®, Тройсет®, Цілитель®*



Альтернаріоз

Гарт® (профілактично), Захисник®, Тройсет®, Цілитель®, Антигусінь® + Самшит®*

Комплексна система захисту цибулі




1 Серпень-вересень

Однорічні та багаторічні дводольні і злакові види бур'янів: осот рожевий, пирій повзучий, берізка польова та інші

Гліфовіт Екстра, 20-35 мл або **Антибур'ян**, 30-50 мл на 3 л води на сотку

Підготовка площ під посів/
висаджування цибулі: восени після збирання врожаю попередника




2 2-3 листки

Шкідники: цибулева муха, трипси
Хвороби: пероноспороз, альтернаріоз

Фас, 2 мл на 3-5 л води + **Цілитель**, 25 г на 5 л води (або **Гарт**, 25 г на 3-5 л води) на сотку

Злакові бур'яни: мишій сизий, пирій повзучий, просо куряче та інші
Антипирій, 10-20 мл на 3-5 л води або **Квін Стар Макс**, 6-12 мл на 2-3 л води на сотку

Гербіциди вносять окремо від фунгіцидів та інсектицидів



3 4-5 листків

Хвороби: пероноспороз, альтернаріоз, стефільоз

Тройсет, 20-25 г на 5 л води або **Цілитель**, 25 г, або **Гарт**, 25 г + **Авангард НРК + М/Е Овочеві**, 30 мл на 3-5 л води на сотку



4 8-9 листків

Шкідники: цибулева дзюрчалка, цибулева міль, цибулева муха, трипси

Хвороби: гниль денця, фузаріоз, альтернаріоз, сіра гниль, борошниста роса

Ато Жук, 3 мл + **Авангард Стимул**, 10 мл + **Захисник**, 20-24 мл + **Авангард НРК + М/Е Овочеві**, 60 мл на 6-10 л води на 2 сотки

Кліщі: **Антикліщ Про**, 6-10 мл на 5-8 л води на сотку

Злакові бур'яни: **Антипирій**, 10-20 мл на 3-5 л води або **Квін Стар Макс**, 6-12 мл на 2-3 л води на сотку

Гербіциди вносять окремо від фунгіцидів та інсектицидів



5 90% від маси цибулини

Хвороби: пероноспороз, гниль денця

Гарт, 25 г або **Віоліс**, 20-25 мл на 5 л води на сотку

Закладка цибулі на тривале зберігання: **Фундазим**, 10 г на 2 л води (після збору врожаю рівномірно нанести на цибулини та дозволити підсохнути)



Для покращення ефективності дії препаратів додавати

Тандем® або **Інгрес®**

Детальніше про застосування препаратів Ви можете дізнатися на сайті:

apteka-sadivnyka.ua

Піклуємось про газонні трави



відеоінструкція



Основні шкідники та хвороби



Дротяник

Антихрущ®



Личинки хрущів

Антихрущ®




Підгризаючі совки

Антихрущ®



Снігова пліснява

Фундазим®



Борошниста роса

Захисник®, Сільвер®, Страж®, Фундазим®*



Іржа

Антигусинь® + Самшит®

Комплексна система захисту газону

1 Березень-травень



Хвороби: прикореневі гнилі, снігова пліснява, фузаріоз, плямистості листя

Фундазим, 10 г на 3-5 л води на сотку
Перед обприскуванням газон ретельно очищають від сухих і відмерлих рослинних решток (вичісування). Обприскування проводять двократно з інтервалом 10-14 днів

3 Кінець квітня – серпень



Ґрунтові шкідники: личинки хрущів, дротяників, підгризаючі совки та інші

Антихрущ, 10-15 мл + **Авангард NPK + M/E Квіти, трави**, 30 мл на 5 л води
Можна використати садову ліжку, щоб препарат максимально змочив ґрунт

4 Жовтень-листопад



Хвороби: плямистості листя, снігова пліснява

Страж, 9 г або **Фундазим**, 10 г, або **Сільвер**, 15 мл на 3-5 л води на сотку
Обприскування проводять після останнього скошування газону

2 Кінець квітня – вересень



Однорічні та багаторічні дводольні види бур'янів:

грицики звичайні, кульбаба, конюшина, маргаритка

Гольф, 3 г на 3-5 л води на сотку + **Авангард NPK + M/E Квіти**, трави, 30 мл на 5 л води
Обприскування проводять рівномірно, не допускаючи перекриття. Небажано обробляти молоді газони віком до 6 місяців. Не проводити обробку впродовж трьох днів після скошування

.....



Для покращення ефективності дії препаратів додавати

Тандем® або **Інгрес®**

Детальніше про застосування препаратів Ви можете дізнатися на сайті: arteka-sadivnyka.ua

.....

Піклуємось про троянди



відеоінструкція

Основні шкідники та хвороби



Розанова цикадка

Антигусінь® + Самшит®, Ато Жук®, Гудвін®, Фас®*



Трояндові попелиці

Антигусінь® + Самшит®, Ато Жук®, Гудвін®, Фас®*, Флористін®* (обприскування заселених шкідником частин)



Трояндовий пильщик

Антигусінь® + Самшит®, Ато Жук®, Гудвін®, Фас®*, Флористін®* (обприскування заселених шкідником частин)



Борошниста роса

Антигусінь® + Самшит®, Захисник®, Сільвер®, Інферно®, Фундазим®*



Чорна плямистість


Антигусінь® + Самшит®, Захисник®, Сільвер®, Фундазим®, Цілитель®*



Сіра гниль

Захисник®, Сільвер®, Страж®, Цілитель®*

Комплексна система захисту троянд



Шкідники: зимуючі стадії шкідників

Захват Ойл, 1.5–2% (150–200 мл) + **Гарт**, 30 г на 3–5 л води



Шкідники: ґрунтові шкідники, попелиці, пильщики, цикадки

Антихрущ, 10 мл на 5 л води із розрахунку 0.5–1 л під кущ



Хвороби: борошниста роса, сіра гниль
Профілактично проти зимуючих спор борошнистої роси, сірої гнилі

Фундазим, 15–20 г + **Страж**, 6 г на 5–8 л води на сотку



Хвороби: сіра гниль, борошниста роса, плямистості

В період вегетації за перших ознак хвороб: **Сільвер**, 15 мл + **Авангард НРК + М/Е Квіти, трави**, 30 мл на 5 л води

Норма витрати робочого розчину – 0.5 л на кущ. Повторне обприскування проводять через 10–12 днів після попередньої обробки



Шкідники: попелиці, трипси, пильщики, листокрутки, кліщі
Хвороби: борошниста роса, іржа

Флористін, 500 мл на 10 м², **Авангард НРК + М/Е Квіти, трави**, 30 мл на 5 л води
В період вегетації проводять до двох обробок



Шкідники: попелиці, трипси, павутинний кліщ, пильщик
Хвороби: борошниста роса, іржа, чорна плямистість

За появи попелиць, трипсів:
Ато Жук (або **Гудвін**, 1.5 мл на 3–5 л води на сотку) + **Авангард НРК + М/Е Квіти, трави**, 30 мл на 5 л води
За появи павутинного кліща:
Антикліщ Про, 10 мл або **Ескаліп**, 5–7.5 мл на 8–10 л води на сотку
За перших ознак хвороб: Антигусь, 4 мл + **Самшит**, 3 мл на 5–8 л води



Хвороби: борошниста роса, іржа, сіра гниль

За перших ознак прояву хвороб проводять обприскування інсекто-фунгіцидом

Флористін, 500 мл на 10 м²
При сильному розвитку хвороби наступне обприскування проводять через 10 днів



Для покращення ефективності дії препаратів додавати

Тандем® або **Інгрес®**

Детальніше про застосування препаратів Ви можете дізнатися на сайті:

apteka-sadivnyka.ua

Піклуємось про декоративні

(листяні і хвойні)



відеоінструкція



Основні шкідники та хвороби



Туева міль

Антикоррад® Макс, Антигусь® + Самшит®, Ато Жук®, Гудвін®, Фас®*



Самшитова вогнівка

Антикоррад® Макс, Антигусь® + Самшит®, Ато Жук®, Гудвін®, Фас®*



Щитівки

Обробка у фазі бродяжки: Ато Жук®, Гудвін®*



Звичайне шютте сосни

Гарт®, Інферно®, Сільвер®, Фундазим®*



Іржа

Антигусь® + Самшит®



Борошниста роса

Захисник®, Інферно®, Сільвер®, Фундазим®*

Комплексна система захисту листяних і хвойних насаджень

Листяні породи



Хвороби: борошниста роса дуба, акації, глоду та інших

Особливо великої шкоди хвороби завдають молодим насадженням. За перших симптомів хвороб проводять обприскування фунгіцидом **Сільвер**, 15-20 мл на 5 л води або **Фундазим**, 15-20 г на 10 л води. Профілактично проти ґрунтових шкідників на початку вегетації проводять прикореневий полив розчином **Антихрущ**, 10-15 мл на 5 л води із розрахунку 1-2 л під рослину, залежно від висоти дерева **В період вегетації проти шкідників та хвороб застосовують бінарний комплект:**

Антигусінь, 4 мл + **Самшит**, 3 мл на 5-8 л води

За вегетаційний період проводять не більше трьох обприскувань Чергувати обробки інсекто-фунгіцидом **Флористін**, 500 мл на 10 м²

Хвороби: плямистості листяних дерев (церкоспороз, септоріоз)

За появи перших ознак прояву хвороб проводять обприскування фунгіцидом **Захисник**, 15 мл або **Сільвер**, 15-20 мл на 5 л води

Хвойні породи



Хвороби: шютте червоне, шютте сніжне

Ознаки хвороби проявляються на початку весни після танення снігу. Найбільше уражуються молоді насадження. Уражену глицію та гілки видаляють і спалюють

Для захисту застосовують фунгіцид **Гарт**, 40-50 г або **Інферно**, 50-80 г на 10 л води

За сезон проводять до чотирьох обробок

Перша рання обробка – профілактична з мінімальною нормою витрати препарату. За появи ознак хвороби норму збільшують до максимальної. Останню профілактичну обробку проводять наприкінці осені при плюсових температурах

Хвойні породи



Профілактично на початку вегетації проводять прикореневий полив розчином

Антихрущ, 10-15 мл на 5 л води із розрахунку 1-2 л під рослину, залежно від висоти рослин

В період вегетації застосовують бінарний комплект: **Антигусінь**, 4 мл + **Самшит**, 3 мл на 5-8 л води
За вегетаційний період проводять не більше трьох обприскувань

Шкідники: ґрунтові шкідники, щитівки (ялівцева та ін.), попелиці та інші

Обприскування в період вегетації проводять такими препаратами:

Фас, 1,5 мл або **Гудвін**, 1,5 мл на 3 л води

За появи кліщів: **Антикліщ Про**, 9-10 мл або **Ескаліп**, 5-7,5 мл на 8-10 л води



Для покращення ефективності дії препаратів додавати **Тандем®** або **Інгрес®**

Детальніше про застосування препаратів Ви можете дізнатися на сайті: apteka-sadivnyka.ua

Захист картоплі від бур'янів



Лобода біла

Селефіт®, Антисапа®, Антисапа® Ліквід, Варяг®*



Щириця звичайна

Селефіт®, Антисапа®, Антисапа® Ліквід, Варяг®*



Пирій повзучий

Тівітус® + Тандем®, Антипирій®, Квін Стар® Макс*



Плоскуха звичайна

Тівітус® + Тандем®, Антипирій®, Варяг®
Квін Стар® Макс*



Галінсога дрібноквіткова

Антисапа®, Антисапа® Ліквід, Варяг®,
Селефіт®, Тівітус® + Тандем®*



Грицики звичайні

Антисапа®, Антисапа® Ліквід, Варяг®,
Селефіт®, Тівітус® + Тандем®*



Мишій (види)

Антипирій®, Антисапа®, Антисапа® Ліквід,
Варяг®, Квін Стар® Макс, Селефіт®,
Тівітус® + Тандем®*



Грциця польова

Антисапа®, Антисапа® Ліквід, Селефіт®,
Тівітус® + Тандем®*

.....
*Використовувати один із вказаних препаратів.

Селефіт® і Варяг® можна застосовувати тільки до сходів культури.

Антисапу застосовують до сходів або ж після сходів культури. Якщо на ділянці переважають злакові, краще використовувати **Антипирій®** або **Квін Стар® Макс**

Детальніше про застосування препаратів Ви можете дізнатися на сайті apteka-sadivnyka.ua

.....

Захист томатів від бур'янів



Пирій повзучий

Антипирій®, Квін Стар® Макс,
Тівітус® + Тандем®*



Грястиця збірна

Антипирій®, Квін Стар® Макс,
Тівітус® + Тандем®*



Зірочник середній

Антисапа®, Антисапа® Ліквід, Варяг® Тівітус® +
Тандем®*



Рутка лікарська

Антисапа®, Антисапа® Ліквід, Варяг®, Тівітус® +
Тандем®*



Тонконіг (види)

Антипирій®, Антисапа®, Антисапа® Ліквід,
Квін Стар® Макс, Тівітус® + Тандем®*



Прчиця польова

Антисапа®, Антисапа® Ліквід, Тівітус® +
Тандем®*



Лобода біла

Антисапа®, Антисапа® Ліквід, Варяг®*



Нетреба (види)

Антисапа®, Антисапа® Ліквід*

.....
*Використовувати один із вказаних препаратів.

Варяг® можна застосовувати лише до висаджування розсади.

Антисапу® застосовують до сходів/ висаджування розсади або ж після сходів культури.

Якщо на ділянці переважають злакові, краще використовувати **Антипирій®** або **Квін Стар® Макс**

Детальніше про застосування препаратів Ви можете дізнатися на сайті apteka-sadivnyka.ua

.....

Захист моркви від бур'янів



Редька дика

Антисапа® Ліквід, Селефіт®*



Грицики звичайні

Антисапа® Ліквід, Селефіт®*



Щириця звичайна

Антисапа® Ліквід, Селефіт®*



Лобода біла

Антисапа® Ліквід, Селефіт®*



Галінсога дрібноквіткова

Антисапа® Ліквід, Селефіт®*



Портулак городній

Антисапа® Ліквід, Селефіт®*



Пирій повзучий

Антипирій®, Квін Стар® Макс*



Мишій (види)

Антипирій®, Антисапа® Ліквід, Квін Стар® Макс, Селефіт®*

.....
*Використовувати один із вказаних препаратів. **Антисапу Ліквід** та **Селефіт** застосовують до сходів або ж після сходів культури.

Якщо на ділянці переважає пирій, краще використовувати **Антипирій®** або **Квін Стар® Макс**

Детальніше про застосування препаратів Ви можете дізнатися на сайті arteka-sadivnyka.ua

.....

Захист полуниці та буряків від бур'янів



Портулак городній

Віталон Експерт®



Амброзія полинолиста

Віталон Експерт®



Ромашка (види)

Віталон Експерт®



Жабрій звичайний

Віталон Експерт®



Пирій повзучий

Антипирій®, Квін Стар® Макс*



Мишій сизий

Антипирій®, Віталон Експерт®, Квін Стар® Макс*



Редька дика

Віталон Експерт®



Волошка синя

Віталон Експерт®

.....
*Використовувати один із вказаних препаратів.

Якщо на ділянці переважають злакові, краще використовувати **Антипирій®** або **Квін Стар® Макс**

Детальніше про застосування препаратів Ви можете дізнатися на сайті apteka-sadivnyka.ua

.....

Захист газонних трав від бур'янів



Кульбаба лікарська



Берізка польова



Спориш звичайний



Конюшина



Щириця звичайна



Лобода біла



Осот (види)



Ромашка

.....
Заборонено обприскувати молодий газон віком до 6-8 місяців та з підсівом бобових трав! Не випускати впродовж 3-5 днів домашніх тварин (котів, собак, птицю та ін.).

Також заборонено годувати травною сівськмих тварин.

Детальніше про застосування препаратів Ви можете дізнатися на сайті apteka-sadivnyka.ua

.....

Проти вказаних бур'янів використовувати гербіцид Гольф®

Захист плодкових культур і виноградників від бур'янів



Осот рожевий



Пирій повзучий



Берізка польова



Спориш звичайний



Амброзія полинолиста



Підмаренник чіпкий



Лобода біла



Молочай лозяний

.....

*Використовувати один із вказаних препаратів. Обрискування проводити, уникаючи потрапляння на культурні рослини!

Детальніше про застосування препаратів Ви можете дізнатися на сайті apteka-sadivnyka.ua

.....

**Проти вказаних бур'янів використовувати гербіциди:
Антибур'ян[®], Гліфовіт Екстра^{®*}**

Ознаки дефіциту елементів живлення на культурах та підживлення культур



Дефіцит азоту



Дефіцит фосфору



Дефіцит калію



Дефіцит кальцію



Дефіцит магнію



Дефіцит заліза



Дефіцит марганцю





Дефіцит бору

.....
Детальніше про застосування препаратів Ви можете дізнатися на сайті apteka-sadivnyka.ua
.....

Залежно від культур, використовувати наступні мікродобрива: Авангард® NPK + M/E Виноград, Авангард® NPK + M/E Овочеві, Авангард® NPK + M/E Плодово-ягідні, Авангард® NPK + M/E Квіти, трави

Піклуємось про рослини разом



apteka-sadivnyka.ua

Виробник
ТОВ «Укравіт Сайенс Парк»
Україна, 18028, м. Черкаси,
вул. лейтенанта Мукана, 9, 11/1
ukravit.ua

Телефон гарячої лінії:
0 800 301 401